TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI
KOORDİNASYON DERNEĞİ
XI. KONGRESİ

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ XI. KONGRESİ

TRANSPLANTASYON 2016

13-15 Ekim 2016

T.C. Sağlık Bakanlığı

The Transplantation Society

Eurotransplant International Foundation

P4-KADAVRADAN RENAL TRANSPLANTASYON SONRASI EDİNSEL ÇİNKO EKSİKLİĞİNE BAĞLI GELİŞEN ACRODERMATITIS ENTEROPATİKA OLGU SUNUMU

Bayraktar A. [1], Bakkaloğlu H. [1], Azamat İ.E. [1], Çalışkan Y.K [2], Sarı Ş.Ö. [3], Büyükbabani N. [3], Baykal C. [4], Aydın A.E. [1]
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Transplantasyon Ünitesi, İstanbul-Turkey [1] İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul-Turkey [2] İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul-Turkey [3] İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul-Turkey [4]

Amaç

Kadavradan böbrek nakli sonrasında ekstremitelerde ve yüzde oluşan cilt reaksiyonları sonrası kazanılmış çinko eksikliği saptanan olgumuzu sunmayı amaçladık.

Olgu Sunumu

Olgu 21 yaşında erkek hasta. Yaklaşık 7.5 yıldır nefronofitizise bağlı son dönem böbrek yetmezliği tanısı ile diyalize girmekte olan hastaya kadavradan böbrek nakli yapıldı ve nakil sonrası 16. günde hasta sorunsuz olarak taburcu edildi. Ameliyattan yaklaşık 1.5 ay sonra hastanın ellerinde, ayaklarında ve yüzünde döküntülü eksema tarzında lezyonlar oluşması ve diyare şikayeti eklenmesi üzerine yapılan tetkiklerinde serum çinko düzeyi 0,23 microgram/ml (referans aralığı 0,92 - 1,44 microgram/ml) saptandı. Ayaklardaki lezyonlardan yapılan punch biyopside intraepidermik vezikül oluşumu ile seyreden bir spongiyotik dermatit saptandı. Bulgular laboratuar sonuçları ile birlikte değerlendirildiğinde çinko eksikliğinde de görülebilecek bulgular olarak yorumlandı. Hastaya oral çinko tedavisi başlandıktan kısa süre sonra lezyonlar regrese oldu ve hasta sorunsuz olarak taburcu edildi.

Sonuç

Çok nadir görülen bir hastalık olsa da erişkin yaşta akral dermatit ile başvuran ve eşlik eden yandaş hastalıkları olan olgularda edinsel çinko eksikliği (acrodermatitis enteropatica) ayırıcı tanıda bulundurulması ve akılda tutulması gereken bir hastalıktır.