
TÜRKİYE ORGAN NAKLİ
KURULUŞLARI
KOORDİNASYON
DERNEĞİ
6. KONGRESİ
"Elele Organ Naklinde
Zirveye"
Transplantasyon 2008
ERZURUM
15-18 Ekim 2008
Polat Renaissance Otel
www.tx2008.org

S21

KIRK BEŞ YAŞ ÜSTÜ KADAVRADAN BÖBREK NAKİLLİ HASTALARDA NAKİL ÖNCESİ DİYALİZ SÜRESİNİN NAKİL SONRASI BÖBREK SÜRVİSİ ÜZERİNE ETKİSİ

Bakkaloğlu H[1]., Şahbaz NA[1].,Bayraktar A[1]., Akıcı M[1]., Tunca F[1]., Çalışkan Y[2]., Sever MŞ[2]., Aydın AE[1]., Eldegez U[1].

[1]*İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Transplantasyon Ünitesi, İSTANBUL*

[2]*İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İSTANBUL*

Amaç: Son dönem böbrek yetmezliğinde (SDBY) böbrek nakli seçilmiş tedavi yöntemidir. İmmünolojik tetkik ve immunsupressif tedavide günümüze kadar olan ilerlemeler sayesinde hiperakut ve akut rejeksiyon oranlarında anlamlı düşüş sağlanırken, kronik allogreft nefropatisine (KAN) gidişi engellemede başarı oranı düşük olmaya devam etmektedir. Bu çalışmada 45 yaş üstü alıcılarda nakil öncesi diyaliz süresinin böbrek sürvisine etkinliği araştırılmıştır.

Metod: Haziran 1988 ile Aralık 2007 tarihleri arasında nakil ünitemizde kadavradan böbrek nakli olmuş 45 yaş üstü hastalar retrospoktif olarak incelendi. Böbrek yetmezliğinin nedeni ile nakil öncesi diyalize giriş süresinin böbrek sürvisine etkisi değerlendirildi.

Sonuç: Haziran 1988 ile Aralık 2007 tarihleri arasında ünitemizde 241 kadavradan böbrek nakli olmuş hasta arasından 45 yaş üstü toplam 38 hasta saptanarak incelendi. Hastalarda k/e oranı 12/26 olup ortalama yaş 49.3 (45-62) yıldı. En uzun takip süresi 241 en kısa takip süresi ise 7 ay olarak saptandı. Nakil öncesi diyalize giriş süresi 1 ay ile 120 ay arasında değişiklik göstermektedir. Takip süresinde 26 (%68) hastada böbrek fonksiyonları normal sınırlarda devam ederken 12 (%32) hastada KAN veya ölüme bağlı olarak takip sonlandırılmıştır. On iki hastanın 5'i böbrek dışı çeşitli nedenlerle hayatını kaybetmiştir. Yedi hastada ise KAN gelişmiştir. KAN gelişen 5 hastada SDBY sebebi bilinmezken birinde kronik piyelonefrit ve 1'inde polikistik böbrek hastalığı nedeniyle SDBY gelişmiştir.
KAN gelişen 45 yaş üstü böbrek nakilli hastalarda böbrek yetmezliğinin sebebi ve nakil öncesi diyaliz süresi ile böbrek sürvisi arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. İstatistiksel olarak veri hesaplamaları için yeterli hasta sayısına ulaşmak için zamana ihtiyaç duyulmaktadır.

S22

KADAVRADAN BÖBREK NAKLİ SONRASI ERKEN DÖNEM ÜRETER KOMPLİKASYONLARINA MİNİMAL İNVAZİV YAKLAŞIM DENEYİMİMİZ

Bakkaloğlu H[1]., Şahbaz NA[1]., Tunca F[1]., Çalışkan Y[2]., Türkmen A[2]., Güven K.[3] ,Rozanes İ.[3],Aydın AE[1]., Eldegez U[1].

[1]*İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Transplantasyon Ünitesi, İSTANBUL*

[2]*İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İSTANBUL*

[3]*İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, İSTANBUL*

Amaç: Böbrek nakli sonrası % 3-8 oranında üretere ait erken dönem komplikasyonlar görülebilmektedir. Bu çalışmada kliniğimizde kadavradan böbrek nakli sonrası erken dönemde oluşan üretere ait komplikasyonlarda uygulanan minimal invaziv girişim deneyimimiz paylaşılmıştır.

Yöntem: Çalışmamızda Ocak 2001 ve Mayıs 2008 yılları arasında canlıdan ve kadavradan böbrek nakli yapılan toplam 77 hastanın dosya bilgileri geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Ameliyat sonrası üretere ait gelişen erken dönem komplikasyonlar ve bu komplikasyonlara uygulanan tedavi yöntemleri ile klinik bulgular kaydedilmiştir.